

农业天地(88)

《农业天地》专栏
投稿邮箱:dainingning123@163.com
联系电话:82439487 地址:路桥区西路桥大道 539 号

区单季晚稻农药减量控害增效实施模式图

生育期	五月		六月			七月			八月			九月			十月			十一月	
	下旬		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	
	播前准备		播种育秧期			移栽分蘖期			孕穗抽穗期			灌浆成熟期							
重大病虫害发生期	重大病虫害			螟虫															
				稻纵卷叶螟															
				灰飞虱、白背飞虱					白背飞虱		白背飞虱、褐飞虱			褐飞虱		褐飞虱、灰飞虱			
				黑条矮缩病							纹枯病								
												稻曲病							
									细菌性病害										
									稻瘟病										
农艺防治措施	播种前				秧田期				移栽期				本田期						
	选用高产、优质、高抗品种;浸种前晒种,提高种子活力;选择秧田排灌方便,集中连片;秧板平整;清除周边杂草,避免灰飞虱迁入;在黑条矮缩病发生严重地区适当增加用种量,杂交稻亩用种量增加150~300克。粳糯稻用1.5%二硫氰基甲烷(的确灵)wp875倍,浸种48小时,杂交粳稻用25%咪鲜胺(施保克)EC3000~4000倍,浸种24小时,消灭种传病菌。催芽露白后每公斤种子拌5%氟虫腈SC8~10毫升或25%吡虫啉WP1~1.5克,预防黑条矮缩病和稻蓟马。防雀害可在催芽后播种前,每1公斤稻种拌35%好年冬种衣剂8~10克。				合理施肥,科学用水,培育壮苗。从2叶期开始做好治虱防矮工作,每隔3~5天防治一次,亩用40%毒死蜱EC100毫升或50%敌·氟腈EC(灵蛙)100毫升,当灰飞虱成虫大量出现时,可用80%敌敌畏EC150~200毫升喷雾(秧苗2叶1心期前禁止使用敌敌畏),同时兼治稻蓟马、螟虫、纵卷叶螟。移栽前亩用5%氟虫腈SC40毫升兑水喷雾,做好带药下田。				清除大田田边杂草;翻耕耙田后打捞“浪渣”(菌核),减少纹枯病的菌源;增施有机肥,厩肥经腐熟后使用;氮、磷、钾肥合理搭配,避免偏施氮肥;整平田板,开好“丰产沟”,沟渠畅通。为减轻黑条矮缩病发生,适当提高插种本数,改单本插为双本插。				合理密植,浅水插秧,深水护苗促活棵;返青后及时追施促蘖肥;移栽后15~20天内出现黑条矮缩病及时采取掰健蘖补病缺的补救措施;分蘖够苗后适时适度排水搁田;孕穗至扬花期浅水灌溉,灌浆成熟期干湿交替,后期不可过早断水。						
	主要病虫害种类		螟虫		稻纵卷叶螟		稻飞虱				纹枯病		黑条矮缩病		稻瘟病		稻曲病	细菌性病害	
	防治适期		本田在卵孵高峰后3~5天		低龄幼虫高峰期		低龄若虫高峰期				发病始盛期		秧苗2~7叶期 本田初期		叶瘟初见,急性型病斑出现,破口抽穗期和齐穗期。		破口抽穗前5~7天	发病初期(发病中心),出现急性型病斑,受淹田块,台风暴雨影响后。	
	防治指标		分蘖期亩枯鞘团100个或株枯鞘率1~1.5%;抽穗期株害率0.1%。		百丛有效虫量:分蘖期40条,穗期20条。		每丛虫量:分蘖期2头,孕穗抽穗期5~8头,灌浆期15头。				分蘖期丛病率10~15%,穗期丛病率20%。		秧田期灰飞虱有效虫量0.15头/尺 ²		在病区孕穗期叶病率2%,破口期一齐穗期用药预防。		破口抽穗前5~7天用药预防	查到发病中心,急性型病斑;病区经台风暴雨过境后,受水淹及下游的稻田。	
化学防治措施	选用药剂(亩用量)		防治二化螟用40%氯虫·噻虫啉(福戈)WG8毫升或5%氟虫腈(锐劲特)SC30~40毫升,兼治大螟用5%氟虫腈(锐劲特)SC20~30毫升+40%毒死蜱EC50毫升喷雾。		用40%氯虫·噻虫啉(福戈)WG8毫升,40%毒死蜱EC100毫升,31%氟腈·唑磷(三拂)ME70~80毫升喷雾。		白背飞虱:用10%吡虫啉WP50克或25%噻嗪酮(扑虱灵)WP50克喷雾;褐飞虱:25%噻嗪酮(扑虱灵)WP50~60克或25%噻·异WP(必杀灵)90克,当发生量大时25%噻嗪酮(扑虱灵)WP50克+40%毒死蜱EC100毫升或25%异丙威EC200毫升喷雾。水稻生长后期田间无水时,可用80%敌敌畏EC300~400毫升拌砂20~30公斤撒施熏蒸。				5%井岗霉素AS150毫升或30%苯甲·丙环唑(爱苗)EC15毫升喷雾。		40%毒死蜱EC100毫升(乐斯本EC90毫升)或25%异丙威EC200毫升或5%氟虫腈(锐劲特)SC40~50毫升,当秧苗期灰飞虱成虫大量出现时,可用80%敌敌畏EC150~200毫升喷雾(秧苗2叶1心期前禁止使用敌敌畏)。		20%戊唑醇(三环唑)WP100克或40%稻瘟灵WP75克喷雾。		30%苯甲·丙环唑(爱苗)EC15毫升喷雾。	20%噻菌铜(龙克菌)SC100克或50%氯溴异氰尿酸(杀菌王)水溶性粉剂40克喷雾。	
	操作规范		喷雾时,关好田水,配好量准所需药剂,加足水量(应用新型手动16型背包式喷雾机,前期40公斤/亩细喷雾,中后期60~70公斤/亩粗喷雾;东方红弥雾机在分蘖期前20公斤/亩,中后期适量增加;机动喷雾机在中后期65公斤/亩),对准靶标,喷洒均匀,及时收集和集中堆放废农药包装瓶(袋),注意安全。																
安全用药	农药品种		氟虫腈	三唑磷	杀虫单	毒死蜱	吡虫啉	噻嗪酮	戊唑醇	稻瘟灵	噻菌铜	注意事项							
	一个生长季节最高使用次数(次)		2	2	3	2	2	2	2	2	3	1.加强病虫监测,适时开展防治。2.科学合理用药。在多种病虫害混发时,确定主治和兼治对象,尽量选用一药多治;在一季稻中不要单一药剂多次连用,应交替轮换使用。3.严禁使用高毒高残农药及国家明令禁用的药剂,严格遵守安全间隔期。4.高温季节宜早晚用药,确保防效和用药安全。							
	安全间隔期(天)		7	21	15	15	7	14	21	28	15								
	禁用农药		甲胺磷 水胺硫磷 呋喃丹 氧化乐果 甲基 1605 稻瘟净 异稻瘟净 所有拟除虫菊酯类杀虫剂及其复配剂																

台州市路桥区农技总站制 电话:82439293



今日Q吧
QQ号:601295273

这是我们的一个互动平台,如果您对某些社会现象包括身边发生的事情有话要说,就请告诉我们,谢谢~~

Q吧群号:35348698
mail:lqdaily@yahoo.com.cn

QQ 小知识

女性便秘 不妨试试跳绳

小真:我来提供一则健康知识。
吧主:好啊。
小真:女性发生便秘的机率要比男性高。因为女性吃东少西、细、精,因此肠道蠕动更慢。另外女性运动量较少,而坚持规律的锻炼可以使肠道更好地蠕动。
吧主:有哪些方法呢?
小真:最好的方式就是通过跳绳震动内脏。弹跳能刺激骨骼、肌肉,促进血液循环,此外还能加强淋巴系统的免疫功能,

这对缓解便秘十分重要。便秘患者走路时,可以尽量加大腰和胯部的转动。像模特一样走猫步,这能起到对腹腔按摩的作用,能够加强内脏,特别是胃肠的蠕动,促进营养的吸收和废弃物的排出,对胃肠功能失常、消化不良引起的便秘疗效明显。另外,像慢跑、游泳、大步走这些体育运动,坚持练习也能起到预防和减缓便秘症状的作用。同时,便秘患者还要注意调节饮食,尽量多吃一些“渣性食品”。

QQ 说事

小贝:前天夜里,我错把老公当成了小偷,还打电话通知一个住在附近的男性朋友来帮忙抓小偷,差点闯大祸了。
吧主:怎么回事啊?
小贝:前几天我跟老公闹别扭,他住到厂里去了。前天夜里12时多,我被楼下开大门的声音惊醒了。
吧主:你老公回来了?

小贝:我拨打老公的手机,一直无人接听,楼下不断地传来一些声响,我想肯定是来小偷了。我只能打电话向住在附近的小张求助,小张是我老公的好朋友。一听这事,小张拿起家里的菜刀就跑到我家大门口等“小偷”出来。
吧主:啊!那后来怎么样?
小贝:我突然想到用手机打家里的座



错把老公当小偷

机,用电话铃声吓跑“小偷”,结果我老公接起了电话。原来,我老公没带手机,准备回来拿几把钥匙就走。小张说自己本来准备等“小偷”一出门就一刀砍过去,我现在想想都后怕啊。
吧主:呵呵,夫妻之间拌了嘴,事后两人各退一步就没事了。抓小偷也应小心,慎动刀噢。

世纪广场前的十字路口,红绿灯被路边的树挡住了,行人几乎看不见,存在诸多隐患,希望有关部门对遮挡红绿灯的大树进行修整。安子 摄

QQ 眼

大树「长个」挡了红绿灯

有事您Q我